

# Smertepumpe

til automatisk smertebehandling ved infusion



## Sådan virker pumpen

Pumpen er fyldt med lokalbedøvelse og tømmer sig selv med en bestemt hastighed. Lokalbedøvelsen lindrer dine smerter efter operationen.

Pumpen er tilsluttet et kateter (lille slange), som ligger ind i operationsområdet.

Vi har valgt lokalbedøvelse og en hastighed som er tilpasset specielt til dig.

## Under infusionen

Du bærer pumpen i den udleverede bæltetaske. Efterhånden som lokalbedøvelsen afgives vil stemplet nærme sig nul på siden af pumpen.

Har du indtryk af at det ikke løber ind, kontrollerer du:

- at der ikke er knæk på slangen
- at pumpen ikke er tom (stemplet er i bund)

## Efter infusionen

Når infusionstiden er gået har du fået al lokalbedøvelsen.

Infusionstiden er \_\_\_\_\_ for den udleverede pumpe.

Du kan selv fjerne kateteret. Det gør ikke ondt at fjerne kateteret. Sørg for at have rene hænder inden du starter. Fjern kateteret ved et roligt træk. Kateteret ligger ca. 7-10 cm inde i operationsområdet.

Der vil sive lidt væske/blod fra såret, så vi anbefaler at du sætter et plaster på såret.

Hvis kateteret glider ud eller skilles ad i samlingen, skal du fjerne det.

Pumpen og kateteret kasserer du som almindeligt affald.

Er du usikker, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Du skal kontakte os hvis du får:

- tiltagende smerter
- rødme, hævelse eller udsivning fra selve kateteret
- bivirkninger ved medicinen

## Navn på lokalbedøvelsen

- Bupivacain 0,25%
- Bupivacain 0,5%
- Naropin 0,2%
- Naropin 0,75%
- \_\_\_\_\_